


Мониторинг эффективности терапии Радия хлоридом, ²²³Ra

Рекомендации по ведению и мониторингованию терапии Радия хлоридом, ²²³Ra

Для контроля используется тот же метод, каким была проведена диагностика до назначения первой инъекции Радия хлоридом, ²²³Ra



Рекомендации по проведению лабораторной и инструментальной диагностики до/на фоне/после терапии Радия хлоридом, ²²³Ra¹⁻⁴

Параметр	До назначения	На фоне терапии (перед последующей инъекцией)	После завершения курса терапии# (через 3 месяца и далее)
БАК			
АЛТ, АСТ, креатинин, Ca, Fe	+	+	+
Тестостерон	+	+	+
В т.ч. биомаркеры*			
Общая ЩФ	+	+	+
ЛДГ	+	±	+
ПСА	+	+	+
Радиологический контроль**			
Остеосцинтиграфия***	+	±	+
КТ/МРТ	+	±	±
Другое			
ОАК			
Гемоглобин	≥100 г/л	≥80 г/л	+
Тромбоциты	≥100x10 ⁹ /л	≥50x10 ⁹ /л	+
Нейтрофилы	≥1,5x10 ⁹ /л	≥1,0x10 ⁹ /л	+
Клиника	+	+	+

Примечания: + – обязательно, ± – необязательно.

При ухудшении лабораторных и клинических показателей решение о проведении радиологического контроля принимается лечащим врачом индивидуально вне зависимости от рекомендованных сроков.

* Изолированное повышение одного из биомаркеров не является критерием отмены терапии. Быстрый рост ПСА, ЩФ и ЛДГ в сочетании с усилением боли и появлением новых симптомов говорит о возможном прогрессировании, следует провести радиологический контроль и рассмотреть опции по смене тактики лечения.

** ПЭТ/КТ с ПСМА проводить для контроля при наличии клинического или выраженного биохимического прогрессирования или, если исходно выполнялось ПЭТ/КТ с ПСМА перед началом терапии Радия хлоридом, ²²³Ra.

*** Остеосцинтиграфия имеет принципиальное значение при назначении Радия хлорида, ²²³Ra, так как именно это исследование позволяет наиболее точно определить распределение препарата в теле пациента.

АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, БАК – биохимический анализ крови, КТ – компьютерная томография, ЛДГ – лактатдегидрогеназа, ОАК – общий анализ крови, ПСА – простатспецифический антиген, ЩФ – щелочная фосфатаза, мКРРПЖ – метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы.

Список литературы

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Радия хлорид, ²²³Ra. Регистрационное удостоверение: ЛП-№(004981)-(PF-RU). 2. Каприн А.Д., Алексеев Б.Я., Матвеев В.Б., Пушкарь Д.Ю., Ньюшко К.М. и др. Клинические рекомендации Ассоциации онкологов России по лечению пациентов с РПЖ. 2021. 3. Перепухов В.М., Алексеев Б.Я., Ньюшко К.М. Современные подходы к лечению метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы с применением таргетной радионуклидной терапии у пациентов с метастазами в костях. Онкоурология. 2024;20(4):132-138. 4. Крылов В.В., Кочетова Т.Ю., Пронин А.И. Отечественный радиофармацевтический препарат Радия хлорид, ²²³Ra: первый год применения в России. Реальная практика, эффективность и профиль безопасности. Возможности комбинированной терапии. Онкоурология. 2025;21(4):15-23.